

Fragmenta mycologica XII. Auctore P. A. Karsten.

Endogone versiformis Karst. (N. sp.)

„*Peridia tuberculiformia, irregularia, mollia, ex hyphis ramosis inarticulatis, circa 6 mmm crassis contexta, carneo-pallida vel pallido-ochracea, albofloccosa*“, sicca subochracea, usque ad 1 cm lata. Sporangia subsphaeroidea, albida, diam. 65—95 mmm. Sporae sphaeroideae.

In horto botanico Helsingforsensi in calidariis (frigidioribus) subsepulta in terra plantarum m. Nov.-Jan. leg. Cel. W. Nylander.

Ab *End. pisiformi* Link. forma, magnitudine nec non colore discrepat. An *End. macrocarpa* Tul?

Hypochnus mucidulus Karst. ut varietas. *Hyp. umbrini* (Fr.) est censendus.

Exosporium Padi Karst. (N. sp.)

Sporodochia conoideo-vel convexo-pulvinata, superficialia, atra, diam. 0,5—0,7 mm.

Conidia elongata, utrinque leviter attenuata, recta, 1—3-septata, olivaceo-fuliginea, longit. 60—71 mmm, crassit. 14—20 mmm.

In ramis corticatis *Pruni Padi* emortuis prope opp. Wasa, m. Junio 1864.

Exosporio Tiliae Link. affine, sed minus notisque supra datis facile distinctum.